



# Seed Library

---

## Growing Instructions

### Carrots – Naval

#### CULTURE:

Carrots require well-drained soils, with a pH range of 6.0-6.8. Deep, loose, and fertile sandy loams and peat soils with good moisture-holding capacity grow the straightest and smoothest roots.

#### PLANTING:

Sow 3/4–1" apart, 1/4– 1/2" deep, in a 2"-wide band, or single rows 16–24" apart. For minimum soil compaction, use raised beds with 2 or 3 rows 16–24" apart, beds 5–6' on center. Sprinkle the soil surface to keep moist. Do not allow soil to crust before the emergence of seedlings, which takes 1–3 weeks, depending on temperature and moisture. If necessary, thin young seedlings to 3/4–2" apart, depending on root size desired. Keep weed-free by tine weeding and shallow hoeing. To prevent greening, cover exposed crowns.

#### HARVEST:

Carrots may be dug any time after they reach the desired size. Generally, the best harvest period lasts about 3 weeks, after which time the roots may crack or the taste and appearance may decline. Make a few sowings at 3-week intervals for a continuous supply of tender carrots at their prime.

For more information about Seed Library, visit [phoenixpubliclibrary.org](http://phoenixpubliclibrary.org) or call 602-262-4636 (for TTY dial 7-1-1).



# Seed Library

## Instrucciones de Cultivo

### Zanahorias: Naval

#### CULTIVO:

Las zanahorias requieren suelos bien drenados, con un rango de pH de 6.0 a 6.8. En los suelos franco-arenosos y de turba profundos, sueltos y fértiles con buena capacidad de retención de humedad crecen las raíces más rectas y lisas.

#### PLANTACIÓN:

Siembre a una distancia de 3/4" a 1", a una profundidad de 1/4 a 1/2", en una banda de 2" de ancho o en hileras individuales de 16 a 24" de distancia. Para una compactación mínima del suelo, use camas elevadas con 2 o 3 hileras con una separación de 16 a 24", camas de 5 a 6' pies en el centro. Rocíe la superficie del suelo para mantenerlo húmedo. No deje que el suelo forme una costra antes de la aparición de las plántulas, lo que tarda de 1 a 3 semanas, dependiendo de la temperatura y la humedad. Si es necesario, realice aclareo de las plántulas jóvenes a una distancia de 3/4 a 2", según el tamaño deseado de la raíz. Mantenga libre de malezas mediante deshierbe con púas y azado superficial. Para evitar el enverdecimiento, cubra las coronas expuestas.

#### COSECHA:

Las zanahorias se pueden sacar en cualquier momento después de que alcancen el tamaño deseado. Generalmente, el mejor periodo de cosecha dura aproximadamente 3 semanas; después de ese tiempo, las raíces pueden agrietarse o el sabor y la apariencia pueden disminuir. Haga algunas siembras en intervalos de 3 semanas para obtener un suministro continuo de zanahorias tiernas en su mejor momento.

Para más información sobre Seed Library, visite [phoenixpubliclibrary.org](http://phoenixpubliclibrary.org)  
o llame al 602-262-4636 (para TTY marque 7-1-1).



**PhoenixPublicLibrary**