



Seed Library

Growing Instructions

Parade Bunching Onions

PLANTING:

Seed can be sown in early spring for summer use, and in July or August for fall and spring use. Bunching onions prefer a soil with a pH of 6.2–6.8.

DIRECT SOWING: Sow seeds 1/4 inch deep, 1/4 inch apart in rows 2-3 inches wide.

TRANSPLANTING: Start seeds indoors 5-6 weeks before the last frost, maintaining a temperature of 59-68°F. Transplant seedlings 2-6 inches apart after the last frost. Space rows 6-24 inches apart. Keep soil consistently moist, especially during germination and early growth.

HARVEST:

Stop watering a week before harvest. Harvest when the necks soften and start to fall over.

For more information about Seed Library, visit phoenixpubliclibrary.org
or call 602-262-4636 (for TTY dial 7-1-1).



PhoenixPublicLibrary



Seed Library

Instrucciones de Cultivo

Cebollín Parade

PLANTACIÓN:

Puede plantarse a comienzos de la primavera para usar en el verano, y en julio o agosto, para usar en otoño o primavera. Los cebollines prefieren tierra con un pH de 6.2–6.8.

SIEMBRA DIRECTA: Plante las semillas a 1/4 de pulgada de profundidad, con 1/4 de pulgada de separación, en filas de 2-3 pulgadas de ancho.

TRASPLANTE: Comience la germinación interior 5-6 semanas antes de la última helada y mantenga una temperatura de 59-68 °F. Realice el trasplante después de la última helada y coloque las plántulas a 2-6 pulgadas de distancia en filas con 6-24 pulgadas de separación. Mantenga la tierra húmeda, en especial durante la germinación y el crecimiento temprano.

COSECHA:

Interrumpa el riego una semana antes de la cosecha. Coseche los cebollines cuando los tallos estén blandos y comiencen a caerse.

Para más información sobre Seed Library, visite phoenixpubliclibrary.org
o llame al 602-262-4636 (para TTY marque 7-1-1).



PhoenixPublicLibrary